ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ШЕЛЬФА СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ

Леонова Т.Д.,

*Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН,
Владивосток*

Аннотация. Представлены результаты исследования рельефа шельфа северной части Охотского моря. Системный подход сделал возможным охарактеризовать районы шельфа как мультифункциональные геоморфологические системы с присущими им особенностями саморазвития. В работе комплексы рельефа рассматриваются как в типологическом (типы внутреннего шельфа), так и в региональном аспектах (геоморфологические районы).

Ключевые слова: *шельф, рельеф, геоморфологический район.*

GEOMORPHOLOGICAL ZONING OF THE SHELF OF THE NORTHERN PART OF THE OKHOTSK SEA

Leonova T.D.,

V.I. Ilyichev Pacific Oceanological Institute of the Far Eastern Branch

Abstract. The results of a study of the shelf relief of the northern part of the Okhotsk Sea are presented. A systematic approach has made it possible to characterize the regions of the shelf as multifunctional geomorphological systems with their inherent features of self-development. In this work, complexes of the relief are considered both in typological (types of the inner shelf) and in regional aspects (geomorphological areas).

Keywords: *shelf, relief, geomorphological area.*

Введение. На протяжении многих десятилетий шельф Охотского моря был объектом пристального внимания специалистов самого различного профиля, но работы, посвященные рельефу шельфа, немногочисленны, и до настоящего времени практически отсутствуют обобщающие работы, посвященные геоморфологическому районированию. Системный подход сделал возможным охарактеризовать районы шельфа как мультифункциональные геоморфологические системы с присущими им особенностями саморазвития и определенной устойчивостью отношений между ее частями.

Материалы и методы. В основу публикации были положены данные экспедиционных исследований ТОИ ДВО РАН и БИФ ВНИРО: результаты эхолотных промеров, полученные на научно-исследовательском судне (НИС) «Первенец» (август - сентябрь, 1976 г.), на НИС «Профессор Гагаринский» (июль - август, 2016 г.), НИС «Осмотрительный» (июнь – сентябрь, 2011 г.).

Результаты и их обсуждение. Шельф представляет собой своеобразный природный комплекс, в котором отражена информация о геологическом строении, истории развития и современных литодинамических процессах, т.е. это система, состоящая из совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих комплексов. В этой работе рельеф поверхности рассматривается как в типологическом (типы внутреннего шельфа), так и в региональном аспектах (геоморфологические районы).

Континентальный трап (ступенчатая континентальная окраина) Охотского моря - это единый в генетическом отношении шельф, располагающийся на двух батиметрических уровнях: верхний до 160 - 200 м, нижний – до 1600 м.

Объектом исследований является верхний шельф северной части Охотского моря до глубин 200 м, в котором выделили две зоны: внутренняя и внешняя. Были выделены

морфогенетические типы внутреннего шельфа. Определены две основные группы шельфов: эндогенные и экзогенные [1].

Эндогенные (тектонические) шельфы северной части Охотского моря характеризуются относительно высокими средними уклонами (20' - 30'). К группе экзогенных относятся шельфы, рельеф которых сформирован преимущественно экзогенными процессами. В пределах северной части Охотского моря можно выделить два типа: аккумулятивный и эрозионный.

Важным условием любой системы является выявление границ. Внешней границей внутреннего шельфа принимаем склон до 160 -200 м, а внутренней – береговую линию (контакт водной среды и суши). Боковые границы районов определяются характером расположения береговой линии, геологическим строением суши, гидрологическим режимом и др. Выделено 4 геоморфологических района: Западный, Северо-Западный, Северный, Шелиховский (рис. 1).

Рис.1. 1-суша; 2 номера промерных галсов; 3- номера районов; 4 - изобаты

Западный район. Район простирается от мыса Врангеля до мыса Маджалинда. Этот сектор Охотского моря характеризуется довольно сложной конфигурацией береговой линии, многочисленными островами и заливами: Удским, Тугурским, Академии, включающим заливы Константина, Ульбанский и Николая. Основные черты тектонического строения Пришантарья определяются его расположением в зоне пересечения складчатых систем: субширотно ориентированных сегментов палеозойско – мезозойской Амуро-Охотской и субмеридиональных структур позднемезозойской Сихотэ-Алиньской, а также вулканических поясов: юрско-раннемелового Удского и ранне-позднемелового Хингано-Охотского [3]. Проявляющиеся на побережье осадочные, вулканогенно-осадочные и магматические формации палеозойско-мезозойской складчатости и вулканических поясов, отраженные в современном рельефе сочетанием сводово-глыбовых и горстовых горных сооружений, являются основой комплекса акустического фундамента Пришантарской части Охотского моря. Расположенные между хребтами рифтогенные кайнозойские впадины, выраженные в рельефе суши речными долинами и прибрежными аллювиально-морскими равнинами, выполнены преимущественно аллювиальными кайнозойскими отложениями большой мощности [3, 6].

Климат отличается значительной контрастностью и суровостью. Средняя многолетняя температура воздуха в районе Пришантарья составляет в июле всего + 10,5°C. Продолжительность ледового периода - около 250 суток [8]. Характерной особенностью района являются высокие приливы, сопровождающиеся сложными приливно-отливными течениями. Наибольшая величина прилива – в вершинах Тугурского залива (9.7 м) и Удской губы (10.1 м). Наибольшие скорости приливного течения в водах, омывающих Шантарские острова – 186-433 см/с [4]. Приливно-отливные течения являются важным фактором

морфолитогенеза, формируя холмисто-грядовый рельеф дна и обуславливая промывной режим в эрозионных каналах.

В рельефе Пришантарья выделены практически все генетические типы шельфа, характерные для северной части Охотского моря; эндогенный (тектогенный) и экзогенные (аккумулятивный и эрозионный). Тектогенный тип приурочен к побережью Шантарских островов, Тугурского полуострова и отдельным участкам залива Академии и Удской губы. Такой шельф почти повсеместно выделяется зоной повышенных значений уклонов (до 15') и приурочен к зонам дифференцированных (часто разнонаправленных) неотектонических движений.

Самым распространенным типом шельфа в этом районе является экзогенный (аккумулятивный и эрозионный). Аккумулятивный тип приурочен к вершинам и бортам заливов (уклоны 1'-2'), поверхность дна практически выровнена, но отдельные формы рельефа, созданные приливо-отливными течениями, здесь отмечаются. Это и песчаные гряды, и каналы стока, сформированные под воздействием приливо-отливных вод.

Эрозионный тип шельфа приурочен к центральным частям заливов. Здесь можно наблюдать остатки древних речных долин, ложбины стока приливо-отливных вод. Исследования показали, что поперечный профиль практически всех долин гребенчатый, на нем прослеживается ряд параллельных промоин. В плане долины представляют серию воронок. В проливе Линдгольма профиль V-образный с глубиной более 20 м. Впадина Северо-Восточного пролива имеет грабенообразный профиль, глубина которого достигает 104 м. Предполагается, что генезис этой впадины неотектонический [7].

Четко прослеживаются положительные формы рельефа: уступы древних береговых линий, подводные береговые валы, образованные в период субаэрального развития при эвстатических понижениях уровня моря.

Северо-Западный район. Эта часть исследуемого района простирается от мыса Маджалинда до устья реки Улья и отличается прямолинейностью береговой линии, связанной с разломами. Хребты Джугджур, Прибрежный, Ульинский простираются практически параллельно береговой линии. Основу Прибрежного хребта составляют верхнеюрские и нежумеловые эффузивы Удско-Мургаляского пояса, пронизанного поздне меловыми гранитоидами. Гранитоиды преобладают и на низкогорье Ульинского хребта. Хребет Прибрежный обрывается к берегу моря крутыми уступами, сложенными юрскими и меловыми андезитами, дацитами, туфами [6].

Для этого района характерен эндогенный тип шельфа, который отличается большими углами уклона (до 18') и располагается в полосе разрывных нарушений, разграничивающих отдельные блоки побережья (рис. 1; пр.1, 2, 3).

Рис. 2

Северный район располагается от устья реки Улья до мыса Толстой. В тектоническом плане района представлен докембрийский выступ Охотского срединного массива. Этот массив обнажен в бассейнах рек Кухтуй и Охота в виде трех блоков, образованных метаморфическими породами нижнего архея и гранито-гнейсами с абсолютным возрастом 3,7 млрд. лет [5]. Метаморфиты перекрыты отложениями среднего рифея и меловыми эффузивами Охотско-Чукотского пояса [6].

Побережье района испытывает сильное волновое воздействие моря, в результате чего размываются береговые уступы и бенчи, а также примыкающие к ним подводные склоны. Приливы в этом районе невысоки (до 5 м), и только в восточной части Тауйской губы они значительно выше. Скорости течений на подходах к Тауйской губе достигают 80 см/с, а в мористых районах – 40 см/с и менее.

Верхний шельф широкой полосой (180-200 км) тянется вдоль береговой линии. Он ограничен перегибом поверхности дна, положение которого не везде удается определить однозначно. Скорее всего ему соответствует перегиб дна на глубине 160-175 м [9]. На Пьягино-Шелиховском участке наблюдается сужение шельфа до 50 км.

Здесь отмечается и эндогенный шельф (рис. 2; пр. 7), и аккумулятивный экзогенный (рис. 2; пр. 8).

Восточный район протягивается от мыса Толстой до устья реки Пенжина. Западная часть этого региона является продолжением Охотско-Колымского нагорья. Основная часть образована меловыми эффузивами Охотско-Чукотского пояса и перекрыта палеогеновыми андезито-базальтами. На полуострове Тайгонос изучен докембрийский выступ, вытянутый в северо-восточном направлении [2, 5].

Эта часть Охотского моря характеризуется отрицательной среднегодовой температурой (-6°C), высокими приливами (до 13,9 м), сложными приливо-отливными течениями со скоростью до 300 см/с и продолжительностью ледового периода - около 250 суток [8].

В заливе Шелихова ширина шельфа значительная (100-170 км). Гижигинская губа мелководна (50 м). Основным орографическим элементом этого района являются подводные долины в Пенжинской губе и заливе Шелихова. Поперечный профиль имеет четкую V-образную форму, с относительной глубиной 12 - 22 м. Ширина долины составляет 0,7 - 2 км, а крутизна склонов достигает 10° - 12° .

Выводы. В морфологическом облике современного рельефа в значительной степени отражены древние структурные планы и взаимосвязи разновозрастных горных массивов обрамления. Существенное влияние оказали неотектонические процессы, действующие в результате дифференцированных по скорости и знаку вертикальных движений отдельных участков коры. Особую роль сыграли интенсивные экзогенные процессы, которые сформировали здесь крупные поверхности выравнивания и морфоскульптурные формы сложного генезиса.

Литература

1. Астахов А.С. Позднечетвертичное осадконакопление на шельфе Охотского моря. Владивосток: ДВНЦ АН СССР. 1986. 140 с.
2. Белый В.Ф. Структурно-формационная карта Охотско-Чукотского вулканогенного пояса. Магадан: ДВНЦ АН СССР. 1981. 90 с.
3. Геология и нефтегазоносность Охотско-Шантарского осадочного бассейна / В.Г. Варнавский, А.Э. Жаров, Г.Л. Кириллова, О.А. Кровушка, Э.Я. Кропп, В.В. Куделькин, В.Б. Троян, Л.С. Чуйко. Владивосток: ДВО РАН, 2002. 148 с.
4. Гидрометеорология и гидрохимия морей. Охотское море. Т 1X. Санкт-Петербург. Гидрометеоздат. 1998. 344 с.
5. Парфенов Л.М. Континентальные окраины, островные дуги и кинематика мезозойской складчатости. Статья 1. Мезозойды Верхоянско-Чукотской области. Тихоокеанская геология. 1983. №3. С. 3-15.

6. Объяснительная записка к тектонической карте Охотоморского региона масштаба 1:2500000. Ответственные редакторы: Н.А. Богданов, В.Е. Хаин. Институт литосферы окраинных и внутренних морей. Российская Академия наук. Москва: 2000. 193 с.

7. Радкевич Р.О. Результаты сейсмоакустического исследования шельфа западной части Охотского моря // Морская геология и геологическое строение областей питания. Владивосток, 1977. С. 122-132.

8. Справочник по климату СССР. Вып. 34. 1968. Ч. 4. Л.: Гидрометеоздат. 173 с.

9. Г.Б. Удинцев. Рельеф дна Охотского моря // Труды Ин-та океанологии АН СССР. 1957. Т. 22.